
Synergie entre la pollution anthropique et biologique et impacts sur la santé respiratoire au Québec durant le printemps

Synergy between anthropogenic and biological pollution and impacts on respiratory health in spring in Quebec

Alain Robichaud

 <https://www.peren-revues.fr/pollutionatmospherique/6767>

DOI : 10.4267/pollution-atmospherique.6767

Electronic reference

Alain Robichaud, « Synergie entre la pollution anthropique et biologique et impacts sur la santé respiratoire au Québec durant le printemps », *Pollution atmosphérique* [Online], 239 | 2019, Online since 01 février 2019, connection on 27 février 2026. URL : <https://www.peren-revues.fr/pollutionatmospherique/6767>

Copyright

CC-BY

Synergie entre la pollution anthropique et biologique et impacts sur la santé respiratoire au Québec durant le printemps

Synergy between anthropogenic and biological pollution and impacts on respiratory health in spring in Quebec

Alain Robichaud

OUTLINE

1. Introduction
2. Matériel et méthodes
 - 2.1. Indicateur de santé respiratoire
 - 2.2. Ajustement pour la variation spatiale de la pyramide d'âge
 - 2.3. Ajustement pour la variabilité spatiale du tabagisme
 - 2.4. Modèle pour le taux d'émission pollinique du *Betula*
3. Résultats
 - 3.1. Cartographie des taux d'émission de pollen
 - 3.2. Cycle saisonnier des comptes d'épreuve respiratoire au Québec (2005-2014)
 - 3.3. Variabilité spatiale de la prévalence ajustée des comptes d'épreuve respiratoire au Québec (2005-2014)
 - 3.4. Analyse combinée de la pollution anthropique et biologique et impact sur la PÉRA
 - 3.5. Corrélation entre métriques de la qualité de l'air et la PÉRA
4. Discussion
5. Sommaire et conclusion

TEXT

1. Introduction

- 1 La maladie respiratoire est souvent multifactorielle et doit être située dans son contexte environnemental (Poitevin, 2013). On sait depuis des décennies que les facteurs environnementaux atmosphériques peuvent exacerber ou déclencher des symptômes respiratoires (ATS, 1995 ; EPA, 2008 ; D'Amato *et al.*, 2015 ; CLA, 2017). Parmi les facteurs environnementaux présentant un risque sanitaire, figurent la pollution anthropique associée à l'ozone troposphérique, les particules fines, le dioxyde de soufre et le monoxyde de carbone (CLA, 2017).

Bien que de nombreux auteurs en Europe (Peltre, 1998 ; Laaidi *et al.*, 2002 ; Abou Chakra *et al.*, 2010 ; D'Amato *et al.*, 2015) ou au Japon (Ishizaki *et al.*, 1987 ; Okuyama *et al.*, 2007) aient noté l'importance de la synergie lorsque la « pollution » biologique (notamment le pollen allergénique) et la pollution anthropique sont combinées, les études sur ce sujet demeurent très rares au Canada. Le sujet mérite donc davantage d'attention. Selon plusieurs recherches en France (Abou Chakra *et al.*, 2010 ; Poitevin, 2013 ; Sénéchal *et al.*, 2015), les polluants anthropiques (notamment l'ozone ainsi que les particules de pollution s'échappant des moteurs Diesel) ont un effet adjuvant augmentant l'inflammation bronchique et les allergies respiratoires. Au Japon, Ishizaki *et al.* (1987) ont montré que pour une même quantité de pollen dans l'air, la proximité de voies à grande circulation bordées de cèdres accentue la réaction allergène par rapport à des endroits où des forêts de cèdres sont présentes mais où le trafic automobile est moindre. Par ailleurs, des souris exposées aux « particules de Diesel » développent davantage de manifestations d'asthme allergique (Guarnieri et Balme, 2014). Chez l'être humain, on a pu quantifier le risque d'allergie respiratoire en termes de pollution atmosphérique chez les enfants de Californie (Parker *et al.*, 2009). Ainsi, pour chaque augmentation de 10 ppbv d'ozone, la probabilité d'allergie augmente de 20 %. De même, pour 10 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ d'augmentation de particules fines, le risque augmente de 16 %. Le tableau 1 résume les impacts biologiques des polluants les plus reconnus et du pollen sur la santé respiratoire. Au niveau biologique, les polluants induisent une diminution des fonctions pulmonaires, une inflammation et des dommages aux cellules épithéliales bronchiques incluant des microlésions exacerbant l'impact sur la maladie respiratoire, permettant aux aérosols biologiques, notamment le pollen et les macromolécules allergéniques, de pénétrer plus facilement dans l'organisme (Gervais, 1994 ; Abou Chakra *et al.*, 2010 et références incluses ; D'Amato *et al.*, 2015). Notons au passage que la France reconnaît maintenant les aérosols biologiques allergéniques (pollution biologique) comme étant également une menace pour la santé au même titre que la pollution anthropique (Légifrance, 2010), ce qui n'est pas le cas au Canada ou ailleurs en Amérique. Un des aéroallergènes les plus problématiques est le pollen de bouleau, qui peut conduire à une hospitalisation sévère pour asthme au printemps au

Canada (Dales *et al.*, 2008). Guérin (1993) identifie d'ailleurs le pollen de bouleau (*Betula spp.*) comme un puissant allergène et le plus anémophile, puisqu'il peut être transporté sur de grandes distances (~1000 km) par le vent et la turbulence (Sofiev *et al.*, 2006). C'est aussi le pollen d'espèces arborescentes le plus abondant dans l'air au Canada d'après les mesures effectuées (Dr. Paul Comtois, comm. pers.). Finalement, non seulement le pollen de bouleau peut libérer des allergènes puissants dans l'atmosphère, tels que *Bet v1*, *v2* et *v4*, qui sont reconnus comme posant un risque pour les asthmatiques (Schäppi *et al.*, 1997), mais également un mélange de substances pro-inflammatoires connu sous le nom de PALMS (Pollen-Associated Lipid Mediators) et d'adénosine (Traidl-Hoffmann *et al.*, 2003) pouvant même affecter les sujets non-atopiques.

- 2 La pollution (anthropique ou biologique) n'est pas le seul facteur affectant la maladie respiratoire. De nombreux autres paramètres influencent, tels que la prédisposition génétique, le tabagisme, l'alimentation et certaines conditions socio-économiques (voir ATS, 1995 ; von Mutius, 2000 ; D'Amato *et al.*, 2015 ; CLA, 2017). L'un des plus grands défis de cette analyse est de contrôler les facteurs de confusion pour éliminer les biais et de faire ressortir les véritables relations de cause à effet. Par exemple, le tabagisme, dont la prévalence varie géographiquement, est un facteur de confusion important dans l'analyse spatio-temporelle des facteurs environnementaux (Crichton *et al.*, 2012). Le type d'environnement (rural ou urbain) est aussi important. D'ailleurs, Von Mutius (2000) ainsi que Kilpeläinen *et al.* (2002) soutiennent que le fait de vivre en milieu rural offre une certaine « protection » contre les maladies respiratoires comme l'asthme allergique, parce que les jeunes entrent en contact avec des allergènes tôt dans leur vie, de sorte que leur système immunitaire est « entraîné » dès le plus jeune âge à la vie à la ferme (hypothèse hygiéniste).

Tableau 1. Description non exhaustive de différents types de polluants anthropiques et biologiques et leur impact sur la santé respiratoire. Note. I : inflammation respiratoire, B : bronchite, BC : bronchoconstriction, HB : hyperréactivité bronchique, R : rhinite allergique, A : asthme, SO : stress oxydatif augmenté, BPCO : bronchopneumopathie chronique obstructive (Ref. ; S7 : Schäppi *et al.*, 1997 ; D8 : Duchateau, 1998 ; B9 : Broeckert *et al.*, 1999 ; P2 : Portejoie *et al.*,

2002 ; TH3 : Traidl-Hoffmann *et al.*, 2003 ; L5 : Lacroix, 2005 ; O7 : Okuyama *et al.*, 2007 ; M8 : Morgenstein *et al.*, 2008 ; P9 : Pascal, 2009 ; PA9 : Parker *et al.*, 2009 ; AC10 : Abou Chakra, 2010 ; L11 : Laaidi *et al.*, 2011 ; T11 : Thibaudon *et al.*, 2011 ; DW13 : de Weger *et al.*, 2013 ; GM14 : Guarnieri et Balmes, 2014 ; C15 : Chassard *et al.*, 2015 ; DA15 ; D'Amato *et al.*, 2015).

Non-exhaustive description of different types of atmospheric biological and anthropic pollutants and impact on respiratory health. Note. I: respiratory inflammation, B: bronchitis, BC: bronchoconstriction, HB: bronchial hyperreactiveness, R: allergic rhinitis, A: asthma, SO: enhanced oxidative stress, COPD: chronic obstructive pulmonary disease.

Polluants	Type de pollution	Impact sur la santé respiratoire	Impact chez les patients atopiques	Synergie pollen-polluant
Ozone	Photochimique	I, HB, A, BPCO (Réf. L5 ; B9 ; P9 ; AC10 ; GM14), R (réf. AC10)	Augmente la sensibilisation au pollen (réf. L5)	Adjuvant dans la réaction allergique (réf. L5 ; D8 ; PA9 ; AC10)
Dioxyde d'azote	Photochimique (trafic)	A, I, HB, BPCO (réf. L5 ; P9 ; AC10)	Idem (réf. L5)	Rôle adjuvant en combinaison avec d'autres polluants (réf. GM14)
Dioxyde de soufre	Anthropique (industrie lourde)	BC (réf. L5 ; P9 ; AC10 ; GM14)	Pas de lien évident (réf. PA9)	
Particules fines (notamment le diesel et les hydrocarbures aromatiques polycycliques)	Anthropique (trafic et industrie)	I, HB, SO, BPCO (réf. L5 ; P9 ; GM14), A (réf. GM14)	Augmente la sensibilisation au pollen (réf. L5 ; M8)	Diésel absorbe les allergènes, i.e. adjuvant dans la réaction allergique (réf. O7 ; PA9 ; GB14)
Ammoniac	Agricole	A, BC (réf. P2)	Pas de lien évident	Absorbé par le pollen
Pollen	Biologique	R, I (réf. AC10)	PALMS affecte même les sujets non atopiques (réf. TH3). Le pollen peut absorber certains gaz le rendant plus dangereux (réf. C15)	Polluen (agrégat de pollen+polluant), (réf. L5 ; O7 ; D8 ; L11)

Allergènes (diamètre inférieur à 10 microns)	Biologique	R, A (réf. AC10, T11)	Après la pluie, le nombre d'allergènes augmente énormément (réf. S7) favorisant l'asthme	Allergène+polluant plus dangereux (réf. L11 ; T11) notamment en présence de pluie et orages (réf. DA15)
---	------------	-----------------------	--	---


- 3 Le but de l'étude présentée ici est d'aider à caractériser les variations géographiques et les patrons spatiaux du risque pour la santé respiratoire (qui sont mal connus au Québec) et à identifier les points chauds (régions problématiques) où la santé respiratoire est affectée davantage par les pollutions anthropique et biologique (notamment le pollen de bouleau), et leur synergie.

2. Matériel et méthodes

- 5 La province de Québec (PQ) est la région d'étude, située dans l'est du Canada. La figure 1 montre les régions administratives de la province qui incluent quatre grandes zones urbaines : 1) Montréal (région 06), Laval (13), Montérégie (banlieues de la rive sud de Montréal, région 16) et la région de la Capitale Nationale qui comprend la ville de Québec et les zones rurales environnantes (région 03). Le tableau 2 donne les caractéristiques de chacune des régions¹.

Figure 1. Localisation des régions administratives officielles de la province de Québec (PQ).

Location of the official administrative regions of the province of Quebec (PQ).



*Données de Statistiques Canada (recensement 2011), **Basé sur la pyramide d'âge et du groupe de personnes dites sensibles (i.e. groupe 0-14 et 65+). Note. RA : Rural Agricole, RI : Rural Industriel, U : Urbain (population > 400 000 h et densité > 100 h/km²), RE : Rural éloigné (population < 100 000 ou densité < 1 h/km²), RF : rural forestier.

Tableau 2. Description des régions administratives de la province de Québec.

Description of the administrative regions of the province of Quebec.

Région ID	Nom de la région	Acronyme	Population* (milliers)	Densité de population* (/km ²)	Pyra- mide d'âge* (% 0-14/15- 64/65+)	Facteur d'ajuste- ment de l'âge**	Prévalence (%) du tabagisme	Type de sol
01	Bas St-Laurent	BSL	201.2	9.1	14.2/65.6/20.2	1.054	29.4	RA/RF
02	Saguenay-Lac St-Jean	SLJ	277.2	2.9	15.0/67.2/17.8	1.006	32.3	RI/RF
03	Capitale Nationale	CN	710.9	38.9	14.2/68.2/17.6	0.975	27.8	U
04/17	Mauricie/Centre-du-Québec	MAU	501.2	7.5	13.7/65.8/20.6	1.049	30.9	RI/RF

05	Estrie	EST	313.6	31.2	15.9/66.4/17.7	1.031	29.6	RF
06	Montréal	MTL	1915.6	3935.7	15.2/69.4/15.4	0.939	26.9	U
07	Outaouais	OUT	373.9	12.5	17.1/69.8/13.1	0.928	39.3	RF
08	Abitibi-Témiscamingue	ABT	146.7	2.6	17.1/67.8/15.1	0.989	32.0	RI/RF
09	Côte Nord	CTN	95.6	0.4	16.8/68.5/14.7	0.965	35.8	RE
10	Nord-du-QC	NDQ	44.0	0.1	27.6/65.9/6.5	1.048	34.9	RE
11	Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine	GIM	94.5	4.60	13.0/65.9/21.2	1.048	32.7	RE
12	Chaudière-App.	CHAU	418.7	27.8	16.2/66.8/17.0	1.020	26.3	RA
13	Laval	LAV	417.3	1696.4	17.1/68.4/14.5	0.997	27.7	U
14	Lanaudière	LAN	488.9	39.7	17.2/68.3/14.5	0.972	33.3	RI/RA
15	Laurentides	LAU	580.0	28.5	17.0/68.3/14.7	0.972	31.1	RF
16	Montréal	MON	1499.2	134.9	17.0/67.9/15.1	0.986	29.0	RA

- 6 Un moyen efficace de contrôler les facteurs de confusion consiste à effectuer une stratification appropriée des données (Kestenbaum, 2009). Ainsi, l'analyse présentée ici est faite sur une saison à la fois (i.e. ici au niveau du trimestre du printemps) afin de filtrer les facteurs de confusion liés aux changements saisonniers influençant les facteurs environnementaux et la maladie respiratoire, et dont le risque s'applique à d'autres saisons (pollen allergène de *Poaceae* et spores fongiques en été, virus hivernal de la grippe, etc.). De plus, des ajustements ont été apportés pour corriger la différence de pyramide des âges entre les régions (puisque les maladies respiratoires sont souvent liées à l'âge) et aussi pour le niveau de tabagisme d'une région donnée, ces deux facteurs pouvant affecter l'analyse de la variabilité spatiale de la prévalence des comptes d'épreuve respiratoire (PÉR par la suite). Le style de vie relié au statut socio-économique est un facteur important selon Von Mutius (2000) mais plutôt controversé, et de l'influence duquel il est difficile de tenir compte (Pascal, 2009). Par ailleurs, on considère ici que l'accès aux soins de santé ne varie pas d'une région à l'autre de façon significative, étant donné que le régime universel de l'Assurance-maladie du Québec garantit l'accès aux soins quels que soient la région, l'âge ou le statut socio-économique dans la province de Québec.
- 7 Le taux d'émission du pollen de bouleau (*Betula*) a été pris comme proxy pour estimer la « pollution biologique » au printemps, car ce dernier est le pollen le plus allergène et le plus abondant parmi toutes les espèces arborescentes (Guérin, 1993). De plus, il est considéré

comme un proxy pour le pollen d'autres espèces arborescentes dont les maximums surviennent à peu près à la même période du printemps (environ du 15 avril au 15 juin au Québec), l'abondance du pollen de bouleau quant à lui étant maximum au mois de mai. Toutes les analyses statistiques ont été réalisées à l'aide du logiciel SAS®, version 9.2 (procédure STEPWISE ou « pas à pas », GLM (*General Linear Model*) avec le test de Tukey pour évaluer la signifiante statistique et la procédure CORR pour estimer les corrélations (Pearson). Les données sur la qualité de l'air pour différentes régions du Québec ont été obtenues auprès du ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (site web : www.mddlcc.gouv.qc.ca/contenu/index.asp) pour toutes les régions au cours de la période 2005-2014. Les données sur la qualité de l'air sous la forme d'un indice (IQA) prennent en compte l'ozone, les particules fines ($PM_{2.5}$), le dioxyde d'azote (NO_2), le dioxyde de soufre (SO_2) et le monoxyde de carbone (CO)². La première métrique utilisée ici pour évaluer le niveau de pollution anthropique est le pourcentage d'heures où l'indice IQA provincial correspondait à une mauvaise qualité de l'air (PHIQAM par la suite). La deuxième métrique est basée sur l'indice fédéral canadien de la qualité de l'air, connu sous le nom de CAS ou Cote Air-Santé³. Cet indice est calculé selon Stieb *et al.* (2008) et tient compte uniquement des niveaux d'ozone, de dioxyde d'azote et de particules fines. Nous considérons ici le pourcentage d'heures sur lequel cet indice est supérieur à 3 (dénommé %CAS>3 par la suite) comme seconde métrique pour cette étude. Notez que la valeur de CAS de 3 marque un seuil au-delà duquel la population sensible montre des symptômes. Dans cette étude, la valeur de cette métrique a été obtenue pour chaque région de la province de Québec (PQ) en interpolant spatialement partout au Québec les résultats de la cartographie de la pollution anthropique obtenue dans Robichaud *et al.* (2016). Finalement, les données météorologiques accessibles au public pour la PQ⁴ ont été téléchargées pour la période d'étude.

2.1. Indicateur de santé respiratoire

- 8 Selon Crighton *et al.* (2012), qui ont examiné les variations spatiales de l'asthme dans la province de l'Ontario (province voisine du Québec), un indicateur robuste de santé respiratoire devrait représenter plus

qu'un type de service sanitaire (i.e., pas uniquement le nombre de visites aux urgences pour asthme, pour réactivité bronchique, infections respiratoires ou autres). Ainsi, une hypothèse ici retenue est que les estimées de prévalence (nombre de cas de services reliés à la santé respiratoire *per capita*) de comptes d'épreuve respiratoire représentent un indicateur robuste de santé respiratoire. L'Épreuve fonctionnelle Respiratoire (ÉR) est un test que l'on administre dans le contexte de plusieurs maladies respiratoires : asthme, pneumonie, bronchites, apnée du sommeil, BPCO, etc. (RAMQ, Régie de l'Assurance-maladie du Québec, comm. pers., 2010). Le résultat de l'ÉR lui-même n'est pas utilisé ici, mais on calcule plutôt la fréquence à laquelle la population d'une région donnée a recours à l'ÉR. Les comptes de l'ÉR pour différentes régions du Québec sont accessibles sur une base trimestrielle⁵. Pour chaque région administrative, le compte des épreuves respiratoire est divisé par la population totale (obtenue des recensements de Statistiques Canada, voir 4^e colonne du tableau 2) de la région appropriée et est exprimé en pourcentage (PÉR par la suite)⁶. Dans certaines analyses présentées ci-dessous, les données ont également été rassemblées en trois groupes de régions afin d'affiner les analyses : 1) groupe fortement urbanisé : régions de Montréal, Laval, Montérégie et Capitale Nationale (ci-après MTL, LAV, MON, CN : régions 06, 13, 16 et 03 respectivement sur la figure 1) ; 2) groupe rural industriel : Saguenay Lac St-Jean, Mauricie/Centre du Québec, Lanaudière et Abitibi-Témiscamingue (par la suite SLJ, MAU/CQ, LAN et ABT : régions 02, 04/17, 14 et 08 respectivement) ; et 3) le groupe des régions rurales et/ou éloignées (i.e. toutes les autres régions de la figure 1). Cette classification en trois groupes est basée sur l'idée d'examiner différents cas orthogonaux : 1) régions urbaines fortement peuplées où la pollution anthropique observée est modérée ou élevée (trafic urbain) et où les sources d'émission de pollen de *Betula* ont été trouvées plus faibles⁷ ; 2) régions peu soumises à la pollution urbaine mais situées à proximité de grandes régions sources locales de pollen et où les sources de pollution proviennent de l'industrie locale et régionale (pâtes et papiers, fonderies, mines, etc.) ou agricole ; et finalement 3) régions rurales où la pollution urbaine et la population sont plus faibles, mais où la pollution biologique par le pollen de *Betula* peut être élevée.

2.2. Ajustement pour la variation spatiale de la pyramide d'âge

- 9 Un facteur d'ajustement est introduit ici pour tenir compte des variations spatiales de la pyramide des âges qui constitue un facteur de confusion puisque la prévalence de certaines maladies respiratoires comme l'asthme est plus fréquente chez les enfants (de moins de 14 ans) que chez les autres groupes d'âge. D'autre part, d'autres maladies respiratoires (telle que la bronchopneumopathie, BPCO⁸) augmentent avec l'âge, de sorte que la probabilité la plus élevée de BPCO survient chez les adultes de plus de 65 ans (RAMQ, comm. pers. 2010). Les deux groupes d'âge forment une catégorie dite population sensible aux effets de la pollution. Par conséquent, la proportion de la population sensible (0-14 ou 65 ans et plus) par rapport à la population totale est calculée pour chaque région. En utilisant les données du tableau 2 pour la proportion relative de 3 groupes d'âge (0-14/15-64/65+), i.e. le pourcentage de la population sensible a été obtenu et divisé sur la moyenne provinciale de chaque groupe pour obtenir un facteur de correction ajusté selon l'âge (voir résultats à la 7^e colonne du tableau 2).

2.3. Ajustement pour la variabilité spatiale du tabagisme

- 10 Un ajustement est également nécessaire pour corriger l'impact de la variation spatiale du niveau de tabagisme sur l'analyse spatiale de la PÉR. Les données disponibles pour la distribution spatiale de la prévalence du tabagisme à travers le Québec (Info-Tabac, 2010) ont été utilisées ici pour minimiser l'impact de ce facteur de confusion. Le tableau 2 (8^e colonne) donne la prévalence du tabagisme pour l'ensemble du Québec. Le facteur de correction pour les variations spatiales des différentes régions administratives est obtenu simplement en divisant la prévalence (donnée en %) par la moyenne provinciale (i.e. moyenne sur tout le domaine). Il est intéressant de noter au passage que la prévalence du tabagisme est généralement plus élevée dans les régions rurales que dans les grandes régions urbaines au Québec.

2.4. Modèle pour le taux d'émission pollinique du *Betula*

11 Comme aucune cartographie de la concentration de pollen dans l'air n'est disponible à ce moment-ci au Québec pour la période d'étude, une estimation de l'émission pollinique de *Betula* a été établie et est utilisée comme proxy pour déterminer pour une région ou un secteur donné, 1) si le pollen a une origine locale ou provient du transport à longue distance et 2) évaluer le niveau des concentrations de pollen attendues (bas, moyen ou élevé) dans la région ou secteur donné. Une modélisation cohérente de l'émission du flux de pollen est disponible dans la littérature (Helbig *et al.*, 2004, par la suite H04) et est utilisée ici avec quelques modifications mineures (i.e. modifiée pour le genre *Betula* (bouleau) et sa distribution géographique correspondant au Québec). Notez que la paramétrisation de H04 a été adoptée par plusieurs auteurs pour simuler numériquement l'émission et la dispersion du pollen (Sofiev *et al.*, 2006 ; Vogel *et al.*, 2008 ; Efstathiou *et al.*, 2011). En utilisant des facteurs météorologiques simples comme intrants (vitesse de vent, température, humidité et vent) et des paramètres physiologiques moyennés (indice foliaire, hauteur de la canopée, etc.), l'ouverture de l'anthère et la libération du pollen peuvent être paramétrées. Les données météorologiques ont été obtenues du Service Météorologique Canadien. La bouffée du flux de pollen (émission pollinique) obéit à l'équation suivante (Siljamo, 2013) :

12 **Émission = $F_e(t,i,j) \times SA \times D(i,j)$ (1)**

13 où **SA** est la surface d'une tuile de grille cartographique donnée (une tuile d'environ 100 km² est utilisée ici) et **D** est la fraction de végétation de bouleau (fraction 0-1 calculée à partir des données de la figure 1 de Robichaud et Comtois, 2017) et **$F_e(t, i, j)$** est le flux d'émission selon H04. Dans ce modèle, le flux d'émission de pollen (**F_e**) s'écrit :

14 **$F_e = c_e \times K_e \times c^* \times u^*$ (2)**

15 où **c^*** et **u^*** représentent respectivement les valeurs caractéristiques de concentration de pollen (grains/m³) et la vitesse du vent au ras du sol (i.e. vitesse de frottement en m/s), **c_e** un facteur spécifique à la plante (sans dimension) décrivant la probabilité d'émission des

étamines. Ce dernier facteur est nul en dehors de la saison pollinique, d'où l'importance de connaître les dates de début et de fin de la saison de pollen (i.e. paramètres phénologiques). Le début de la saison de pollen est souvent une fonction du nombre de degrés-jour ou d'autres variables météorologiques qui prévalent avant le début de la saison (voir Robichaud et Comtois, 2017 pour plus de détails). Finalement, K_e est un interrupteur également sans dimension, mis à zéro si la vitesse de frottement descend en-dessous d'un seuil prédéterminé. Notez que F_e est le flux d'émission résultant, donné en grains/m²/s. En général, toutes autres choses étant égales, plus la turbulence sera élevée, plus u^* sera important et plus l'émission pollinique sera intense et vice-versa. Plus de détails apparaissent dans Helbig et al. (2004) quant à la forme de ces termes qui sont paramétrés en fonction des caractéristiques des grains de pollen à l'étude.

3. Résultats

3.1. Cartographie des taux d'émission de pollen

- 16 En utilisant la méthodologie présentée ci-dessus (Éqs. 1-2), une cartographie du flux d'émission de pollen de *Betula* à travers le Québec et tout l'Est du Canada est produite pour la première fois ici (voir figure 2 : flux moyen pour mai 2012). Le secteur des Laurentides (incluant les régions 4, 14, 15 et la partie nord-ouest de la région 3, voir la figure 1 pour la localisation des régions) est la plus importante source de pollen au Québec à l'ouest du fleuve St-Laurent. À l'est, les régions de l'Estrie (5) et de Chaudière-Appalaches (12) constituent également une importante source de pollen de *Betula*.

Figure 2. Cartographie des émissions de pollen (moyennes pour mai 2012) pour l'Est du Canada. Note : NE = Nouvelle-Angleterre (USA). Les différents chiffres correspondent aux identifiants des régions administratives données au tableau 2.

Map of pollen emissions (average for May 2012) in eastern Canada. Note. NE = New-England (USA). Numbers refer to administrative region ID given in Table 2.




Figure 2. Cartographie des émissions de pollen (moyennes pour mai 2012) pour l'Est du Canada. Note : NE = Nouvelle-Angleterre (USA). Les différents chiffres correspondent aux identifiants des régions administratives données au tableau 2.

Map of pollen emissions (average for May 2012) in eastern Canada. Note. NE = New-England (USA). Numbers refer to administrative region ID given in Table 2.

3.2. Cycle saisonnier des comptes d'épreuve respiratoire au Québec (2005-2014)

- 17 Les statistiques des comptes enregistrés d'Épreuve Respiratoire (ÉR) ont été compilées sur une période de 10 ans (2005-2014) pour chaque saison à partir des données fournies sur le site web de la RAMQ. L'emphase est mise sur la saison printanière (avril-juin) puisque c'est durant cette période que l'on retrouve l'impact à la fois de la pollution anthropique et du pollen des espèces arborescentes. Les statistiques de ÉR pour les autres saisons sont aussi montrées mais pour des fins

de comparaison seulement avec les statistiques printanières. Le cycle saisonnier du nombre de tests d'épreuve respiratoire enregistrés pour Montréal (le plus grand centre urbain au Québec) est montré dans la figure 3A, avec un minimum trimestriel enregistré en été et un maximum au printemps. La différence entre les deux trimestres (printemps et été) est significative au niveau $p = 0,07$.




Figure 3. Nombre de comptes d'Épreuves Respiratoires (ÉR) enregistrés par saison (2005-2014) pour A) l'île de Montréal, B) pour l'ensemble de la province de Québec. La moyenne est indiquée par un losange, et les rangs centiles 25, 50 et 75 par des lignes horizontales. Les extrémités représentent les valeurs minimum et maximum.

Number of counts of respiratory tests (2005-2014) recorded for each season for a) the island of Montreal, b) the whole province of Quebec. The average is indicated by a diamond and percentiles 25th, 50th and 75th by horizontal lines. Min/max are also indicated.


- 18 Pour l'ensemble de la province de Québec (figure 3B), le cycle saisonnier est similaire à celui de Montréal, bien que la différence entre les saisons des comptes d'ÉR à l'échelle de la province ne soit pas statistiquement significative ($p > 0,10$). Néanmoins, on peut supposer que la diminution enregistrée des comptes d'ÉR en passant du printemps à l'été (environ 8 % sur la figure 3A et environ 10 % sur la figure 3B) est probablement la signature reliée à la fin de la saison du pollen des arbres (à savoir le pollen de *Betula* n'est plus présent dans l'air en été).

Notons que des cycles saisonniers similaires ont été notés pour le nombre de visites à l'urgence pour asthme à Québec (Lajoie *et al.*, 1994) et pour le nombre d'hospitalisations pour asthme à Montréal (Robichaud, 2018, chap. 5), ce qui supporte l'utilisation du nombre de cas d'ÉR comme indice sanitaire d'une population donnée.

3.3. Variabilité spatiale de la prévalence ajustée des comptes d'épreuve respiratoire au Québec (2005-2014)

- 19 Pour mieux comprendre la variabilité spatiale des maladies respiratoires au Québec en fonction de la pollution anthropique et biologique, on examine maintenant les statistiques de prévalence ajustée des occurrences d'ÉR (PÉRA par la suite) pour 16 régions de la PQ pour la période 2005-2014 (figure 4A). On constate que les régions urbaines fortement peuplées (Capitale Nationale, Montréal et Laval, régions 3, 6 et 13) ont tendance à avoir une valeur plus élevée (différence hautement significative, $p < 0.0001$) de la PÉRA comparativement aux régions rurales ou éloignées (régions 5, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15), ce qui représente un résultat anticipé. Mais certaines régions ont aussi une valeur de la PÉRA relativement élevée bien qu'ayant une urbanisation moindre, mais qui comprennent certaines industries primaires (pâtes et papiers, fonderies, transformation des métaux, etc.) ou agricoles sur leurs territoires respectifs. Ces régions (dites rurales industrielles) incluent la région SLJ (région 2), la Mauricie/Centre du Québec (régions 4 et 17 combinées) et l'Abitibi-Témiscamingue (région 8). On doit signaler ici qu'un facteur de confusion important peut possiblement intervenir pour la région de l'Abitibi (région 8). En effet, la mauvaise qualité de l'air intérieur dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue (ABT), qui affecte la prévalence de la maladie respiratoire, est liée à la grande popularité du poêle à bois dans les résidences (environ 40 % de la population en utilise un, selon Statistiques Canada, et jusqu'au printemps en raison des conditions plus froides enregistrées dans cette région). Dans la figure 4B, les régions sont maintenant classifiées en trois groupes différents, le groupe 1 : urbain ; le groupe 2 : rural avec des industries primaires ou agricoles importantes et des sources d'émissions de pollen locales abondantes ; et le groupe 3 : régions rurales ou éloignées à faible pollution (anthropique et/ou biologique). Selon la figure 4B, le groupe

urbain 1 (MTL, LAV, CN) et le groupe industriel rural 2 (SLJ, MAU, ABT) ont tous deux une PÉRA très significativement plus élevée, selon le test de Tukey ($p < 0,0001$), que les régions rurales/forestières ou agricoles (BSL, OUT, CHA, LAU) ou éloignées (CTN, NDQ, GIM) (i.e. groupe 3). Notez que la différence entre les groupes urbain et rural industriel (groupes 1 et 2) n'est pas statistiquement différente ($p > 0,1$), ce qui suggère que vivre en milieu rural (mais avec des industries locales) ne diminue pas nécessairement le risque à la santé respiratoire. Cependant, la différence entre les groupes 1, 2 et le groupe 3 est hautement significative ($p < 0.0001$), i.e. dans le cas de région rurale sans industries polluantes majeures. Les résultats ci-dessus suggèrent que la présence d'une forte industrialisation (générant une pollution anthropique locale) en milieu rural avec, simultanément, à proximité des sources élevées de pollen de *Betula* (voir figure 2) peut expliquer la forte prévalence inattendue pour le groupe 2 (presque aussi élevée que la prévalence du groupe urbain 1). Ce résultat suggère une coopération biochimique entre le pollen allergène et la pollution anthropique (industrielle et agricole), comme il est discuté plus loin. Notez aussi que les variations de la PÉRA entre les différents groupes de région sont d'environ un facteur 2 (sur la figure 4B). À titre de comparaison, Crighton *et al.* (2012) ont trouvé un facteur similaire (1,6) dans les variations géographiques de prévalence de l'asthme en Ontario.






Figure 4. Prévalence ajustée (%) des comptes d'ÉR (PÉRA) (2005-2014) pour la province de Québec : A) dans 16 régions administratives, B) dans les 3 groupes (voir le texte pour plus de détails).

Adjusted prevalence (%) of PEFR (2005-2014) for the province of Quebec: A) in 16 administrative regions, B) in 3 groups (see text for more details).

3.4. Analyse combinée de la pollution anthropique et biologique et impact sur la PÉRA

- 20 Une analyse de la PÉRA en fonction de la moyenne du Flux d'Émission (FE) de pollen ainsi que de la valeur PHIQAM pour chaque région est montrée à la figure 5. L'analyse statistique a été faite en utilisant la procédure GLM du logiciel SAS® (période du printemps 2012, qui est considérée représentative de la période d'étude 2005-2014) pour obtenir l'ajustement optimal des valeurs de la PÉRA (lignes diagonales croissantes sur la figure). Les résultats suggèrent deux régions différentes du domaine où la PÉRA est 1) élevée ($> 0,6$) et 2) basse ($< 0,6$). La figure 5 montre des valeurs de PÉRA supérieures à 0,6 pour 1) les régions fortement urbanisées (triangle), Capitale Nationale, Laval, Montérégie, et Montréal où le pourcentage d'heures d'IQA mauvais (PHAQIM) est plutôt élevé (supérieur à 6 %) ; 2) les régions rurales ou moins urbanisées mais avec des industries de matières premières (points noirs), i.e. régions Abitibi-Témiscamingue, Mauricie/CQ et

Lanaudière, où les valeurs de FE et PHIQAM sont toutes deux élevées. D'autre part, lorsque la PÉRA est faible ($PÉRA < 0,6$), deux sous-groupes apparaissent évidents dans ce domaine sur la figure 5, soit 1) PHIQAM faible mais FE modéré-élevé (20-40), c'est-à-dire les régions LAU, GIM, BSL, OUT et CHA (carrés) ; enfin, 2) les régions éloignées où FE et PHIQAM sont toutes deux faibles (régions CTN et NQ) et où conséquemment la PÉRA est très faible ($< 0,2$). Les résultats suggèrent que, d'une part, les régions où la valeur de PHIQAM et de FE sont toutes deux faibles ont également une valeur de PÉRA faible, ce qui est consistant avec le fait que peu de pollution biologique ou anthropique entraîne moins de problèmes de santé respiratoire. Inversement, les régions fortement urbanisées (i.e. Montréal, MTL) sont associées à une PÉRA plus élevée ($PÉRA > 0,6$) tel qu'anticipé. Cependant, si des industries émettrices de pollution anthropique sont présentes dans des régions rurales et où les sources de pollen sont aussi abondantes localement, la PÉRA pourrait aussi être élevée, surtout si le flux pollinique allergénique (calculé par l'Éq. 1) est modéré ou élevé dans la région (e.g. régions ABT, MAU/CQ, LAN, CN). Ceci suggère une synergie entre la pollution anthropique et biologique exacerbant les maladies respiratoires et augmentant la PÉRA.

Figure 5. Prévalence ajustée (%) des comptes d'ÉR pour le printemps 2012 (PÉRA : lignes diagonales) versus FE (flux d'émission pollinique de *Betula*, grains/m²/s) et PHIQAM (pourcentage d'heures où l'indice de qualité de l'air était mauvais). Rond noir : site rural industriel ; triangle : site urbain ; carré : site rural.

Adjusted prevalence (%) of counts of ER for Spring 2012 (diagonal lines) versus FE (Betula pollen emission flux, grains/m²/s) and PHIQAM (percentage of hours when the air quality index was poor). Black: rural industrial site, triangle: urban, square: rural.




Figure 5. Prévalence ajustée (%) des comptes d'ÉR pour le printemps 2012 (PÉRA : lignes diagonales) versus FE (flux d'émission pollinique de *Betula*, grains/m²/s) et PHIQAM (pourcentage d'heures où l'indice de qualité de l'air était mauvais). Rond noir : site rural industriel ; triangle : site urbain ; carré : site rural.

Adjusted prevalence (%) of counts of ER for Spring 2012 (diagonal lines) versus FE (Betula pollen emission flux, grains/m²/s) and PHIQAM (percentage of hours when the air quality index was poor). Black: rural industrial site, triangle: urban, square: rural.

3.5. Corrélation entre métriques de la qualité de l'air et la PÉRA

- 21 Deux métriques (fédérale et provinciale) basées sur des indices de qualité de l'air utilisés au Québec ont été corrélées avec la PÉRA dans les 15 régions à l'étude pour la période 2005-2014. Le tableau 3 montre les résultats de la matrice de corrélation pour l'ensemble de la province de Québec ($N \sim 150$). Il révèle d'abord que les deux métriques, une basée sur l'IQA québécois (PHIQAM ou pourcentage d'heures où l'IQA était mauvais) et l'autre basée sur la cote fédérale air-santé (%CAS>3) sont assez faiblement corrélées entre elles ($R = 0,49$, $p < 0,0001$). Cependant, la variabilité de PHIQAM d'une région à l'autre (période 2005-2014) est, en général, mieux corrélée avec la PÉRA ($R = 0,70$, $p < 0,0001$) que ne l'est l'indice fédéral (pourcentage d'heures où CAS est supérieur à 3 ; i.e. $R = 0,39$, $p < 0,0001$). À l'opposé, la métrique basée sur la CAS (%CAS> 3) est mieux corrélée ($R = 0,70$; $p < 0,0001$) avec la population totale d'une région donnée (un proxy pour le degré d'urbanisation) que dans le cas de la métrique PHIQAM ($R = 0,34$; $p < 0,0001$). Ces résultats suggèrent que la métrique basée sur l'indice fédéral (i.e. %CAS> 3) est plus appropriée uniquement pour les zones fortement peuplées (haut degré d'urbanisation). Ceci peut s'expliquer par le fait que l'indice CAS a été développé justement pour les zones fortement urbanisées donc fortement peuplées (voir Stieb *et al.*, 2008). Par contre, la métrique basée sur l'IQA québécois (PHIQAM) est mieux adaptée dans l'ensemble des régions. Quoi qu'il en soit, dans tous les cas, le fait que le pollen allergénique et sa synergie avec la pollution anthropique ne soient pas inclus dans le calcul traditionnel des indices de qualité de l'air pourrait expliquer le coefficient de détermination avec la PÉRA plutôt modéré dans le meilleur des cas ($R = 0,70$, i.e. $R^2 < 0,5$ selon le tableau 3).

Tableau 3. Matrice de corrélation de la PÉRA, deux indices de qualité de l'air et la population totale pour les régions de la province de Québec (2005-2014).

Toutes les corrélations sont statistiquement fortement significatives (i.e. $p < 0,0001$, $N = 150$).

Correlation matrix for PERA, two air quality indices and the total population for

different regions of the province of Quebec (2005-2014). All correlations are statistically highly significant (i.e. $p < 0.0001$, $N = 150$).

22

	PÉRA	PHIQAM	%CAS>3	Population
PÉR	1,0	0,70	0,39	0,21
PHIQAM		1,0	0,49	0,34
%CAS>3			1,0	0,70
Population				1,0

Tableau 3. Matrice de corrélation de la PÉRA, deux indices de qualité de l'air et la population totale pour les régions de la province de Québec (2005-2014). Toutes les corrélations sont statistiquement fortement significatives (i.e. $p < 0,0001$, $N = 150$).

Correlation matrix for PERA, two air quality indices and the total population for different regions of the province of Quebec (2005-2014). All correlations are statistically highly significant (i.e. $p < 0.0001$, $N = 150$).

23 Pour l'année 2012 (où les données FE sont disponibles), lorsque la variable FE (Flux d'Émission de *Betula*) est ajoutée comme variable supplémentaire, on constate des résultats supérieurs à ceux montrés au tableau 3. Une équation de régression multiple de type « pas à pas » a été obtenue par la procédure STEPWISE (SAS ©) et est montrée à l'Éq. 3. La procédure « pas à pas » consiste à intégrer les variables indépendantes les unes après les autres en fonction de leur contribution au modèle (en éliminant l'information statistiquement redondante). Notez que la variable « population » (un proxy pour le degré d'urbanisation) n'a pas été retenue par la procédure en raison de son plus faible coefficient de corrélation ($R = 0,34$ selon le tableau 3).

24 **$PÉRA^{0.02} = 0,947763 + 0,00698346*FE^{0.3} + 0,01965*PHIQAM^{0.2}$ (3)**

25 **Variance expliquée : $R^2 = 0,76$ ($p < 0,0001$)**

26 où FE est le flux de pollen émis (grains/m²/s) moyen dans une région donnée et PHIQAM est déjà défini plus haut. Le coefficient de détermination entre la PÉRA et les costresseurs (pollution anthropique et biologique) passe alors à 0,76 ($p < 0,001$), ce qui est significativement plus élevé que dans le cas n'incluant pas la pollution biologique. La contribution partielle pour chaque variable est indiquée sous l'Éq. (3). Ainsi FE seul ne contribue à expliquer que 10 % de la variance, et

PHIQAM environ 0,66. Mais la contribution des deux facteurs en synergie explique plus des trois quarts de la variance.

4. Discussion

- 27 Le but premier de cette recherche est d'isoler et d'évaluer l'impact combiné de la pollution anthropique et biologique sur la santé respiratoire et sa variabilité spatiale. Bien que les causes des maladies respiratoires soient probablement multifactorielles, la coopération bio-physico-chimique (synergie) entre pollution anthropique et biologique semble être la clé ici pour mieux comprendre la relation entre facteurs environnementaux atmosphériques et un indicateur de santé respiratoire (PÉRA). Au niveau biologique, cette synergie peut prendre des formes complexes selon la situation. Sous des conditions humides ou polluées, il peut y avoir une rupture par osmose ou par oxydation du pollen d'arbre respectivement libérant de minuscules allergènes (de l'ordre du micron en diamètre ou moins) qui peuvent pénétrer profondément dans l'appareil respiratoire et déclencher des crises d'asthme ou une hyperréactivité bronchique (Laaïdi *et al.*, 2002 ; Lacroix, 2005 ; D'Amato *et al.*, 2015). Le pollen de bouleau ne fait pas exception (même si son grain est plutôt dur, voir Puc *et al.*, 2016). De même, sous des conditions météorologiques variées, le pollen de bouleau peut libérer des granules cytoplasmiques contenant de puissants allergènes : Bet v1, v2 et v4 (par exemple, sous des conditions pluvieuses selon Schäppi *et al.*, 1997) et également un mélange appelé PALMS (Pollen-Associated Lipid Mediators), qui sont des substances pro-inflammatoires qui affectent l'appareil respiratoire (Traidl-Hoffmann *et al.*, 2003).
- 28 Le milieu urbain représente plutôt une région réceptrice du pollen qui provient du transport à distance moyenne ou longue, alors que le groupe rural/industriel est géographiquement plus près des principales sources polliniques au Québec, et l'exposition au pollen est alors supposée plus élevée tandis que la pollution anthropique est due à des industries primaires (polluant directement émis et non pas de polluants photochimiques souvent présents dans les smogs urbains) ou des sources de pollution agricoles (notamment l'ammoniac). Par ailleurs, il est intéressant de noter que parmi les régions sources les plus importantes pour le pollen de *Betula* (figure 2), figurent les régions des Laurentides et Chaudière/Appalaches (LAU,

région 15 et CHA, région 12). Or celles-ci ont une prévalence relativement faible de la PÉRA (figure 5). Il est suggéré ici qu'il y a peu de synergie polluant anthropique-pollen significative dans ces régions, puisqu'un faible niveau de pollution anthropique y est enregistré⁹, même si le pollen peut être très élevé, car ces régions sont principalement composées de forêts, de montagnes et de terres agricoles (sans élevage, i.e. pas d'émission d'ammoniac ou autres polluants agricoles). Il a été rapporté au Japon (Okuyama *et al.*, 2007) que le pollen mesuré dans les régions montagneuses est beaucoup moins contaminé par les métaux lourds, les gaz polluants et est moins acide et donc moins nocif pour la santé respiratoire. Cela suggère que le risque pour la santé d'une personne atteinte d'une maladie respiratoire est plus élevé dans une région présentant à la fois des niveaux significatifs de la pollution anthropique et biologique, car une synergie est alors probable, le pollen étant aussi un collecteur de pollution anthropique augmentant la réaction allergique respiratoire ; par exemple, le dioxyde d'azote est fortement absorbé par le pollen (Chassard *et al.*, 2015). Dans les régions où les sources de pollen sont élevées mais où la pollution est faible, il est donc peu probable que cette synergie se produise. De même, dans une région fortement urbanisée mais dont les niveaux de pollen sont plus faibles, le niveau de la PÉRA peut être plus bas qu'anticipé. C'est le cas, par exemple, de la deuxième plus grande ville au Québec, Laval, où les niveaux de pollution sont significatifs mais avec une PÉRA plutôt modérée (valeur d'environ 0,6). Finalement, dans une région éloignée (peu de pollution, peu de pollen, comme la partie extrême nord du Québec), la PÉRA est faible, telle qu'anticipée (voir régions 9 et 10, soit CTN et NQ, figures 4 et 5). Notons que les flux FE plus faibles dans les régions fortement urbanisées (en raison de la faible densité des arbres du taxon *Betula*) ne signifient pas que le pollen aéroporté ne soit pas une menace, car le pollen de *Betula* peut souvent être transporté sur de grandes distances et interagir avec la pollution anthropique libérant des allergènes. De fait, à Montréal, de nombreux épisodes de pollen de *Betula* ont été notés dans ces dernières décennies, mesurés par le site d'observation de l'Université de Montréal (Robichaud et Comtois, 2017). Mais de façon générale, les résultats montrés ici soutiennent que la présence simultanée de pollen abondant et de pollution anthropique est nécessaire pour causer une prévalence plus élevée des maladies respiratoires, ce qui se produit

au Québec dans les régions rurales dites industrialisées (e.g. régions MAU/CQ, LAN et ABT¹⁰, voir figure 5). L'étude présentée ici supporte donc le concept de « polluen » qui a été introduit dans la littérature (Peltre, 1998 ; Laaidi *et al.*, 2002) pour décrire un aérosol hybride (polluant anthropique + pollen) plus nocif que n'importe lequel des deux costresseurs pris isolément. Buters *et al.* (2010, 2012) ont documenté des cas où le pouvoir allergisant du pollen présentait une grande variabilité spatio-temporelle, probablement causée, entre autres, par la variabilité des facteurs environnementaux tels que la pollution et la température. Ce résultat est cohérent avec d'autres résultats trouvés dans la littérature traitant de l'interaction pollen-polluant (Behrendt et Becker, 2001 ; Lacroix, 2005 ; Laaidi *et al.*, 2011 ; de Weger *et al.*, 2013 ; D'Amato *et al.*, 2015 ; Sénéchal *et al.*, 2015). Cette grande variabilité spatio-temporelle pourrait mieux s'expliquer avec la synergie de la pollution anthropique comme montré dans la présente étude (i.e. figure 5 et Eq. 4). Fait intéressant, la ville de Québec dans la région de la Capitale Nationale (qui a une pollution modérée et se situe plus près d'importantes sources de pollen) montre une PÉRA aussi élevée que les régions plus fortement urbanisées (MTL, voir les figures 4A et 5). Ceci suggère que l'influence des sources de pollen de *Betula* en présence d'une pollution anthropique même modeste (dans le cas de la ville de Québec et ses environs) peut avoir un impact aussi significatif sur les personnes souffrant de maladies respiratoires qu'un grand centre urbain comme Montréal. Le rôle combiné joué par la pollution et le pollen explique en grande partie les différences entre les régions dans le cas des maladies respiratoires au printemps (76 % de la variance expliquée de la PÉRA par la combinaison pollen-polluant, voir Eq. 3). Un fait intéressant à noter est que, selon un rapport de l'Institut National de Santé Publique du Québec (INSPQ, 2012), la rhinite allergique ne présente pas autant de variations dans sa prévalence (minimum 11,8 % dans la région de la Côte Nord et maximum de 18,7 % à Laval) que l'indicateur de santé utilisé ici (PÉRA), dont la variation spatiale peut varier jusqu'à un ordre de grandeur d'une région à l'autre (figures 4A, 5). Ceci s'explique par le fait que la rhinite est largement causée par le pollen (INSPQ, 2012), alors que l'indicateur de santé utilisé ici (PÉRA) est davantage multifactoriel et dépend entre autres de la synergie polluant-pollen qui peut varier largement, comme en témoigne l'étude présentée ici. Notons finalement que le choix de l'indicateur de santé utilisé ici est

validé par le fait que les corrélations entre PÉRA et les indices de qualité de l'air sont statistiquement significatives et relativement élevées (Éq. 3). De plus, la sensibilité de l'indicateur est évidente en ce qui a trait à la pollution anthropique et biologique (figure 5). L'hypothèse que la PÉRA est un indicateur de santé respiratoire valable semble donc ainsi vérifiée.

5. Sommaire et conclusion

- 29 Dans cette recherche qui relève de la géographie de la santé, des analyses statistiques ont été effectuées afin de mettre en relation les variations spatiales des niveaux de pollution anthropique et biologique et les variations spatiales d'un indicateur de santé respiratoire au Québec durant la saison printanière. L'emphase sur cette saison a été choisie, car le risque de maladies respiratoires estimé dans une région (PÉRA étant utilisé comme un indicateur de santé respiratoire) est plus élevé pendant cette saison dans l'ensemble du Québec, et la combinaison pollen-pollution beaucoup plus probable car le pollen de bouleau (*Betula*) est très abondant au printemps et également très allergénique. Le contrôle des facteurs de confusion utilisant la méthodologie présentée dans cet article permet d'évaluer le rôle relatif des facteurs environnementaux extérieurs ciblés (pollution anthropique et biologique), leur variation spatio-temporelle et leur relation avec la prévalence des maladies respiratoires dans l'ensemble du Québec. Ces résultats suggèrent un rôle subtil des pollutions anthropique et biologique dans les maladies respiratoires qui semblent plutôt fonctionner l'une avec l'autre, synergie pouvant favoriser la formation de nouvelles particules hybrides (telles que le *polluen*) plus susceptibles de libérer des allergènes directement dans l'atmosphère et de déclencher l'asthme ou d'exacerber d'autres maladies respiratoires, tel qu'il a été discuté abondamment dans la littérature récente. Par ailleurs, il a été soutenu que vivre en milieu rural est une protection contre l'asthme ou d'autres maladies respiratoires allergiques (von Mutius, 2000 ; Kilpeläinen *et al.*, 2002). Cependant, bien que les résultats présentés ici démontrent que la PÉRA est plus faible en milieu rural pour des régions éloignées des grands centres urbains, cette hypothèse ne tient plus si le degré d'industrialisation est important dans une région rurale donnée où les sources de pollen allergénique sont abondantes, car une combinaison pollen/pollution

pourrait alors exacerber la maladie respiratoire (e.g. régions rurales de la Mauricie ou de Lanaudière). Finalement, la consistance des résultats avec la littérature (i.e. importance du pollen, de la pollution et de sa synergie associée au risque de maladie respiratoire) suggère que l'indicateur utilisé comme proxy pour la santé respiratoire d'une population (PÉRA) est un choix valide. Les principales conclusions de cette étude sont :

- 30 1) en comparant la baisse de prévalence des cas d'ÉR juste après la fin de la saison pollinique des espèces arborescentes (i.e. chute marquée de la PÉR en passant du trimestre 2 au trimestre 3, figure 3), on déduit que le pollen de *Betula* semble contribuer à environ au moins 8 % des comptes de PÉR pour Montréal et de 10 % pour l'ensemble de la province (PQ). Un modèle de régression multiple supporte cette observation avec le prédicteur FE (flux pollinique) qui explique environ 10 % de la variance de l'indice sanitaire (prévalence ajustée des cas d'ÉR) ;
- 31 2) la PÉRA, au printemps, montre une prévalence significativement plus élevée ($p < 0,0001$) dans les régions à caractère urbain de la province de Québec (MTL, LAV, MON et CN) et/ou dans les régions rurales industrielles (MAU/CQ, LAN et ABT) comparativement à d'autres régions où la pollution est plus faible même si la quantité de pollen peut parfois être élevée (par exemple, si ces régions comportent des régions sources majeures de pollen de *Betula*), à titre d'exemple la région des Laurentides (LAU), ce qui suggère que l'effet combiné (synergie) polluant-pollen affecte davantage la santé respiratoire tel qu'il a été démontré ailleurs (notamment en Europe et au Japon) ;
- 32 3) la métrique dérivée de l'indice provincial de la qualité de l'air (PHIQAM) est mieux corrélée à la PÉRA que la métrique utilisant l'indice canadien de la qualité de l'air (cote air-santé, CAS, i.e. %CAS>3). Par contre, cette dernière est mieux corrélée à la population totale, i.e. montre une meilleure corrélation dans les régions fortement urbanisées. Par ailleurs, l'exclusion du pollen allergénique et de sa synergie avec la pollution anthropique montre un coefficient de détermination plutôt modéré avec la PÉRA (i.e. $R^2 < 0,5$), en ce qui concerne les indices de qualité de l'air (tableau 3). Cependant, ce coefficient passe à 0,76 ($p < 0,0001$) lorsque la pollution biologique est

incluse (Eq. 3). Par conséquent, les indices actuels de qualité de l'air qui informent le public sur les risques de la pollution anthropique pour la santé de la population sensible (indices IQA ou CAS) devraient à l'avenir intégrer également la pollution biologique (à tout le moins le pollen allergène) pour mieux évaluer le risque total sur la santé respiratoire et l'impact sanitaire collectif.

- 33 D'autres études interdisciplinaires sont requises dans le futur pour confirmer les résultats de l'étude présentée ici. Ceci est critique pour informer le public, pour mieux justifier l'allocation des ressources médicales au niveau provincial et pour offrir des explications complémentaires afin de mieux comprendre les déterminants de la maladie respiratoire.

L'auteur tient à remercier Dr. Robert Pampalon (retraité de l'INSPQ) pour quelques discussions utiles reliées à cette recherche. Des remerciements vont également à l'éditeur, Pierre Carrega, pour de judicieux conseils, ainsi qu'aux réviseurs anonymes pour leurs critiques.

BIBLIOGRAPHY

- Abou Chakra OR, Lacroix G, Senechal H, Thibaudon M, 2010 : Synergie pollen-polluants et rôle des facteurs météorologiques sur le risque de pollinose : évolution des consultations dans la région amiénoise pendant la saison pollinique 2007, *Revue française d'allergologie*, 50, 443-449. <https://doi.org/10.1016/j.reval.2009.11.002>
- ATS (American Thoracic Society), 1995 : Health effects of outdoor air pollution, *Am. J. Respir. Crit. Care Med.*, 153, 3-50.
- Behrendt H, Becker WM, 2001 : Localization, release and bioavailability of pollen allergens : the influence of environmental factors, *Current Opinion in Immunology*, 13(6), 709-715. [https://doi.org/10.1016/S0952-7915\(01\)00283-7](https://doi.org/10.1016/S0952-7915(01)00283-7)
- Broeckeaert F, Arsalane C, Hermans C, Bergamaschi E et al., 1999 : Lung epithelial damage at low concentrations of ambient ozone, *The Lancet*, 353, 900-901. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(99\)00540-1](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(99)00540-1)
- Buters JT, Weichenmeier I, Ochs S et al., 2010 : The allergen Bet v1 in fractions of ambient air deviates from birch pollen counts, *Allergy*, 65, 850-858. <https://doi.org/10.1111/j.1398-9995.2009.02286.x>
- Buters JT, Thibaudon M, Smith M et al., 2012 : Release of Bet v1 from birch pollen from 5 European countries. Results from the HIALINE study, *Atmos. Env.*, 55, 496-505. <https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2012.01.054>
- Chassard G, Choël M, Gosselin S et al., 2015 : Kinetic of NO₂ uptake by *Phleum*

pretense pollen : chemical and allergenic implications, *Environmental pollution*, 196, 107-113. <https://doi.org/10.1016/j.envpol.2014.10.004>

CLA (Canadian Lung Association), 2017 : [En ligne]. Disponible sur : http://www.lung.ca/home-accueil_e.php. Accessed June 24th 2017

Crichton EJ, Feng J, Gershon A et al., 2012 : A spatial analysis of asthma prevalence in Ontario, *Can J Public Health*, 103(5), 384-389.

Dales RE, Cakmak S, Judek S, Coates F, 2008 : Tree Pollen and Hospitalization for Asthma in urban Canada, *Int. Arch. Allergy Immunol.*, 146, 241-247. <https://doi.org/10.1159/000116360>

D'Amato G, Holgate ST, Pawankar R et al., 2015 : Meteorological conditions, climate change, new emerging factors, and asthma and related allergic disorders. A statement of the World Allergy Organization. *World Allergy Organization Journal*, 8, 25, <https://doi.org/10.1186/s40413-015-0073-0>

De Weger LA, Bergmann KC, Rantio-Lehtimäki A et al., 2013 : *Impact of pollen*, In : Sofiev M, Bergmann KC (eds.), *Allergenic pollen, a review of the production, release, distribution and health impacts*, Chap. 6, Dordrecht, Springer Science+Business Media, 256 p. https://doi.org/10.1007/978-94-007-4881-1_6

Duchateau J, 1998 : Allergies et environnement. *Revue médicale de Bruxelles*, 19, A355-357.

EPA (US Environmental Protection Agency), 2008 : *Review of the impacts of climate variability and change on*

aeroallergens and their associated effects, Report EPA/600/R-06/164F. <https://cfpub.epa.gov/ncea/risk/recorddisplay.cfm?deid=190306>

Efstathiou C, Isiukapalli S, Georgopoulos P., 2011 : A mechanistic modeling system for estimating large scale emissions and transport of pollen and co-allergens, *Atmos. Environment*, 45(13), 2260-2276. <https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2010.12.008>

Gervais P, 1994 : Maladie asthmatique et agression chimique, *Rev. Fr. Allergol.*, 34(5), 403-407.

Guarnieri M, Balmes JR, 2014 : Outdoor air pollution and asthma, *Lancet*, 383, 1581-1592. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(14\)60617-6](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(14)60617-6)

Guérin B, 1993 : Pollen et allergies, Varennes-en-Argonne, Éditions Allerbio, 279 p.

Helbig N, Vogel B, Vogel H, Fiedler F, 2004 : Numerical modelling of pollen dispersion on the regional scale, *Aerobiologia*, 20, 3-19. <https://doi.org/10.1023/B:AERO.0000022984.51588.30> (<http://dx.doi.org/10.1023/B:AERO.0000022984.51588.30>)

Info-Tabac, 2010 : [En ligne]. Disponible sur : <http://www.info-tabac.ca/>

INSPQ, 2012 : Prévalence des symptômes et du diagnostic de la rhinite allergique chez les 15 ans et plus au Québec, 2008, Institut National de Santé Publique du Québec. https://www.inspq.qc.ca/pdf/publications/1447_PrevalenceSymptDiagnosRhiniteAllerg15AnsEtPlusQc_2008.pdf

Ishizaki T, Koizumi K, Ikemori R et al., 1987: Studies of prevalence of Japanese cedar pollinosis among the residents in

a densely cultivated area, *Ann. Allergy*, 58, 265-270.

Kestenbaum B, 2009 : *Epidemiology and biostatistics : an introduction to clinical research*. Chap. 10, New York, Springer Science+Business Media. https://doi.org/10.1007/978-0-387-88433-2_10

Kilpeläinen M, Terho E, Helenius H, Koskenvuo M, 2002 : Childhood farm environment and asthma and sensitization in young adulthood, *Allergy*, 57(12), 1130-1135. <https://doi.org/10.1034/j.1398-9995.2002.23341.x>

Laaidi K, Laaidi M, Besancenot JP., 2002 : Synergie entre pollens et polluants chimiques de l'air : les risques croisés. *Environnement, Risques et santé*, 1(1), 42-49. https://www.jle.com/fr/revues/ers/e-docs/synergie_entre_pollens_et_polluants_chimiques_de_l_air_les_risques_croises_130005/article.phtml

Laaidi M, Chinnet T, Aegerter P., 2011 : Allergies au pollen, pollution et climat : revue de la littérature, *Revue française d'allergologie*, 51, 622-628. <https://doi.org/10.1016/j.reval.2011.05.004>

Lacroix G, 2005 : Allergies respiratoires, pollens et polluants, *Arch. Mal. Prof. Env.*, 66, 584-591.

Légifrance, 2010 : Code de l'environnement. [En ligne]. Disponible sur <http://www.legifrance.gouv.fr>

Okuyama Y, Matsumoto K, Okochi H, Igawa M, 2007 : Adsorption of air pollutants on the grain surface of Japanese cedar pollen. *Atmos. Env.*, 41, 253-260. <https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2006.08.009>

Morgenstein V *et al.*, 2008 : Atopic disease, allergic sensitization and

exposure to traffic-related air pollution in children, *American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine*, 177, 1331-1337. <https://doi.org/10.1164/rccm.200701-036OC>

Parker JD, Akinbami LJ, Woodruff TJ, 2009 : Air pollution and childhood respiratory allergies in the United States, *Environmental Health Perspectives*, 117(1), 140-147. <https://doi.org/10.1289/ehp.11497>

Pascal L, 2009 : Effets à court terme de la pollution atmosphérique sur la mortalité, *Revue française d'allergologie*, 49, 466-476. <https://doi.org/10.1016/j.reval.2009.08.005>

Peltre G, 1998 : Inter-relationship between allergenic pollens and air pollution, *Allergie et Immunologie*, 30(10), 324-326. PubMed ID 9972354 (<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9972354>)

Poitevin J, 2013 : Asthme : rôle des acteurs environnementaux (2^e partie), *La Revue d'Homéopathie*, 4, 124-132. <https://doi.org/10.1016/j.revhom.2013.10.007>

Portejoie S, Martinez J, Landmann G, 2002: Ammonia of farm origin: impact on human and animal health and on the natural habitat, Internal report AGRIS Institute. [En ligne]. Disponible sur : <http://agris.fao.org/agris-search/search.do?recordID=FR2002003459>

Puc M, Kotrych D, Lipiec A *et al.*, 2016: Birch pollen grains without cytoplasmic content in the air of Szczecin and Bialystok, *Alergoprofil*, 12(2), 101-105. https://www.researchgate.net/profile/Piotr_Rapiejko/publication/305808344_Birch_pollen_grains_without_cytoplasmic_content_in_the_air_of_Szczecin

[f35741eb1a2/Birch-pollen-grains-without-cytoplasmic-content-in-the-air-of-Szczecin-and-Bialystok.pdf](#)

Robichaud A, Ménard R, Zaitseva Y, Anselmo D., 2016 : Multi-pollutant surface objective analyses and mapping of air quality health index over North America, *Air Quality, Atmosphere & Health*, <https://doi.org/10.1007/s11869-015-0385-9>

Robichaud A, Comtois P., 2017 : Statistical modelling, forecasting and time series analysis of birch phenology in Montreal, Canada, *Aerobiologia*, <http://doi.org/10.1007/s10453-017-9488-0>

Robichaud A, 2018 : L'aérobiologie du pollen de bouleau (*Betula* spp.) : synergie avec les facteurs environnementaux et impacts sur la santé respiratoire, thèse de doctorat, Université de Montréal.

Schäppi GF, Suphioglu C, Taylor PE, Knox RB, 1997: Concentrations of the major birch tree allergen Bet v 1 in pollen and respirable fine particles in the atmosphere, *Journal of Allergy and Clinical Immunology*, 100, 656-661. [http://doi.org/10.1016/S0091-6749\(97\)70170-2](http://doi.org/10.1016/S0091-6749(97)70170-2)

Sénéchal H, Visez N, Charpin D *et al.*, 2015 : A review of the effects of major atmospheric pollutants on pollen grains, pollen content and allergenicity, *The Scientific World Journal*. [En ligne] : <https://doi.org/10.1155/2015/940243>

Siljamo P, 2013 : Numerical modelling of birch pollen emissions and dispersion on regional and continental scales.

Finnish Meteorological Institute Contributions no. 99, Helsinki, FMI-CONT-99.

Sofiev M, Siljamo P, Ranta H, Rantio-Lehtimäki A, 2006 : Towards numerical forecasting of long-range air transport of birch pollen : theoretical considerations and a feasibility study, *Int J Biometeorol.*, 50, 392-402. <https://doi.org/10.1007/s00484-006-0027-x>

Stieb DM, Burnett RT, Smith-Dorion M *et al.*, 2008 : A new multipollutant, no-threshold air quality health index based on short-term associations observed in daily time-series analyses, *J. Air Waste Manage. Assoc.*, 53(3), 435-450. <https://doi.org/10.3155/1047-3289.58.3.435>

Thibaudon M, Poirot A, de Blay F., 2011 : Moisissures, orages et asthme, *Revue française d'allergologie*, 51, 560-563. <http://doi.org/10.1016/j.reval.2011.06.001>

Traidl-Hoffmann C, Kasche A, Menzel A *et al.*, 2003 : Impact of pollen on human health : more than allergen carriers ?, *Int. Arch. Allergy and Immunol.*, 131, 1-13. <https://doi.org/10.1159/000070428>

Vogel H, Pauling A, Vogel B, 2008 : Numerical simulation of birch pollen dispersion with an operational weather forecast system, *Int. J. Biometeorol.*, 52, 805-814, <https://doi.org/10.1007/s00484-008-0174-3>

Von Mutius E, 2000 : The environmental predictors of allergic disease, *J. Allergy Clin. Immunol.*, 105, 9-19. [https://doi.org/10.1016/S0091-6749\(00\)90171-4](https://doi.org/10.1016/S0091-6749(00)90171-4)

NOTES

- 1 Notez que la région 17 a été combinée avec la région 4 dans le tableau afin d'être consistant avec différentes bases de données utilisées ici, voir détails ci-dessous réduisant à 16 le nombre de régions.
- 2 Voir pour plus de détails : www.mddelcc.gouv.qc.ca/air/iqa
- 3 <http://ec.gc.ca/meteo-weather/default.asp?lang=En&n=8E7198BB-1websiteECC>
- 4 www.climate.weather.gc.ca
- 5 tableaux SM-20, www.ramq.gouv.qc.ca/fr/donnees-statistiques/Pages/donnees-statistiques.aspx
- 6 Par exemple, pour le trimestre du printemps, environ 12 000 cas de tests d'épreuve respiratoire ont été administrés en moyenne sur la période 2005-2014 à Montréal (figure 3A). En divisant par la population totale moyenne de Montréal durant cette période (environ 1,95 million), on obtient PÉR = 0,63 %.
- 7 La plupart du pollen aéroporté a une origine étrangère dans le cas de ces régions, par exemple à Montréal (Robichaud, 2018, chap. 4).
- 8 Appelée maladie pulmonaire obstructive chronique au Québec.
- 9 Voir : www.mddelcc.gouv.qc.ca/air/iqa
- 10 Notons toutefois que la valeur élevée de la PÉRA en Abitibi-Témiscamingue peut en partie s'expliquer par l'exposition professionnelle (travailleurs de l'industrie minière) et le nombre plus élevé de poêles à bois dans les demeures.

ABSTRACTS

Français

Les pollutions anthropique et biologique ont toutes les deux un impact négatif sur la santé humaine. L'analyse de deux métriques (fédérale et provinciale) basées sur des indices de qualité de l'air couramment utilisés dans la province de Québec (Canada) montre un lien statistique significatif avec un indicateur de santé respiratoire évalué pour différentes régions de la province. Mais lorsqu'elle est combinée avec la pollution biologique au printemps (exprimée par les taux simulés d'émission régionale de pollen de

Betula), cette corrélation devient plus élevée : R^2 passe alors de valeurs inférieures à 0,5 à environ 0,76 ($p < 0,0001$). On explique ici cette augmentation par le phénomène de synergie entre la pollution anthropique et le pollen de *Betula*. Cette synergie est décrite dans la littérature, entre autres, par le concept de *polluen* (polluant + pollen), une combinaison présentant plus de risque pour la santé respiratoire que la pollution anthropique ou le pollen pris séparément. Les résultats de l'étude présentée ici suggèrent que la synergie entre la pollution anthropique et biologique doit être prise en compte. Ainsi, les indices de qualité de l'air actuels devraient intégrer la notion de pollution biologique pour mieux représenter le risque total pour la santé respiratoire des populations, que ce soit au Canada, en France ou ailleurs.

English

Both anthropic and biological pollution have a negative impact on health. The analysis of two metrics (federal and provincial) based on air quality indices often used in the province of Quebec (Canada) shows a statistical link with an indicator of respiratory health of the population of different regions of the province. But when combined with biological pollution in the spring (expressed by simulated *Betula* pollen regional emission rates), this correlation becomes significantly stronger: R^2 goes from values less than 0.5 up to about 0.76 ($p < 0.0001$). This increase is explained by the phenomenon of synergy of anthropogenic pollution with *Betula* pollen. This synergy is described among other things in the literature under the concept of *polluen* (pollutant + pollen) which presents a higher risk on health than pollution or pollen taken separately. The results of the study presented here suggest that this synergy is important and that the current air quality indices should integrate the notion of biological pollution to better represent the total risk to the respiratory health of populations in Canada, France or elsewhere.

INDEX

Mots-clés

indices de qualité de l'air, pollution anthropique, pollen, *Betula*, indicateur de santé respiratoire, *polluen*

Keywords

air quality indices, anthropogenic pollution, pollen, *Betula*, respiratory health indicator, *polluen*

AUTHOR

Alain Robichaud

Université de Montréal, 520 Ch. Côte Ste-Catherine, Montréal, H3C 3J7, Canada
[musgen13\[at\]gmail.com](mailto:musgen13[at]gmail.com)